

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer

Vogelarten der EG-VRL:

- Sumpfohreule
- Trauerseeschwalbe
- Wanderfalke
- Zwergschnäpper
- Heidelerche
- Kampfläufer
- Goldregenpfeifer (Nahrungsgast)
- Säbelschnäbler
- Zwergseeschwalbe
- Flusseeschwalbe
- Küstenseeschwalbe
- Brandseeschwalbe

- Ringelgans (Nahrungsgast)
- Sanderling (Nahrungsgast)
- Alpenstrandläufer (Nahrungsgast)
- Knutt (Nahrungsgast)
- Sandregenpfeifer
- Austernfischer (Nahrungsgast)
- Großer Brachvogel (Nahrungsgast)
- Brandgans (Nahrungsgast)

Lebensräume der FFH-RL:

- Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
- Flache große Meeresarme und -buchten
- Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten
- Quellerwatt
- Watt mit Schlickgrasbeständen
- Salzgrünland
- Primärdünen
- Weißdünen mit Strandhafer
- Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation

Arten der FFH-RL

- Seehund
- Schweinswal
- Finte
- Flußneunauge
- Meerneunauge

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Duvenstedter Brook

Vogelarten der EG-VRL:

- Rohrdommel (Nahrungsgast)
- Weißstorch (Nahrungsgast)
- Wespenbussard
- Rohrweihe
- Seeadler (Nahrungsgast)
- Fischadler (Nahrungsgast)
- Uhu (Nahrungsgast)
- Tüpfelsumpfhuhn
- Wachtelkönig
- Kranich
- Eisvogel (Nahrungsgast)
- Mittelspecht
- Schwarzspecht
- Neuntöter

Lebensräume der FFH-RL:

- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis*
- Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen Raumes mit *Erica tetralix*
- Trockene europäische Heiden
- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehm Boden
- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume
- Geschädigte Hochmoore
- Übergangs- und Schwingrasenmoore
- Torfmoor-Schlenken
- Dystrophe Seen
- Birken-Moorwald
- Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern

Arten der FFH-RL

- Fischotter
- Kamm-Molch
- Große Moosjungfer
- Bauchige Windelschnecke

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Wohldorfer Wald

Vogelarten der EG-VRL:

- Wespenbussard (Nachtrag im SDB)
- Uhu
- Eisvogel
- Scharzspecht
(Brutverdacht?)
- Mittelspecht
- Zwergschnäpper

- Waldschnepfe
- Hohltaube
- Kolkrabe
- Schellente

Lebensräume der FFH-RL:

- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis*
- Hainsimsen-Buchenwald
- Waldmeister-Buchenwald
- Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
- Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern

Arten der FFH-RL

- Fischotter
- Großes Mausohr
- Kamm-Molch
- Bachneunauge
- Dicke Flussmuschel

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Hainesch-Iland

Vogelarten der EG-VRI:

- Eisvogel
- Wachtelkönig
- Mittelspecht

- Wasserralle

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Moorgürtel

Vogelarten der EG-VRL:

- Wachtelkönig
- Neuntöter
- Weißstorch (Nahrungsgast)
- Rohrweihe (Nahrungsgast)
- Tüpfelsumpfhuhn

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

LSG Mühlenberger Loch und NSG Neßsand

Vogelarten der EG-VRL:

- Trauerseeschwalbe
- Flußseeschwalbe
- Seeadler
- Kampfläufer
- Säbelschnäbler

- Spießente
- Löffelente
- Krickente
- Stockente
- Brandente
- Silbermöwe
- Sturmmöwe
- Mantelmöwe
- Lachmöwe
- Zwergmöwe

Lebensräume der FFH-RL:

- Ästuarien
- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume
- Erlen- und Eschenwälder und Weichholzaunenwälder an Fließgewässern
- Offene Sandflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* auf Binnendünen

Arten der FFH-RL:

- Meerneunauge
- Flussneunauge
- Finte
- Rapfen
- Schlammpeitzger
- Schierlings- Wasserfenchel

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Die Reit und Die Hohe

Vogelarten der EG-VRL:

- Rohrdommel
- Weißstorch (Nahrungsgast)
- Rohrweihe
- Fischadler (Nahrungsgast)
- Wespenbussard (Nahrungsgast)
- Tüpfelsumpfhuhn
- Kleines Sumpfhuhn (Nahrungsgast)
- Blaukehlchen
- Eisvogel (Nahrungsgast)
- Trauerseeschwalbe (Nahrungsgast)
- Neuntöter
- Seggenrohrsänger (Nahrungsgast)
- Zwergseeschwalbe (Nahrungsgast)

- Sumpfrohrsänger (Nahrungsgast)
- Teichrohrsänger (Nahrungsgast)
- Rohrammer (Nahrungsgast)
- Rotkehlchen (Nahrungsgast)
- Zilpzalp (Nahrungsgast)
- Wasserralle

Arten der FFH-RL:

- Kamm-Molch
- Bitterling (Nachtrag im Standard-Datenbogen)

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Fischbeker Heide

Lebensräume der FFH-RL:

- Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen Raumes mit *Erica tetralix*
- Trockene europäische Heiden
- Übergangs- und Schwingrasenmoore
- Torfmoor-Schlenken
- Alte bodensaure Eichenwälder mit *Quercus robur* auf Sandebenen

Daneben sind im Standard-Datenbogen folgende Vogelarten aufgeführt:

- Ziegenmelker
- Schwarzspecht
- Heidelerche

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Heuckenlock

Lebensräume der FFH-RL:

- Ästuarien
- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume
- Erlen- und Eschenwälder und Weichholzaunenwälder an Fließgewässern
- Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder am Ufer großer Flüsse

Arten der FFH-RL

- Meerneunauge
- Flussneunauge
- Finte
- Nordseeschnäpel
- Rapfen
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer
- Schierlings-Wasserfenchel

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Schweenssand

Lebensräume der FFH-RL:

- Ästuarien
- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume
- Erlen- und Eschenwälder und Weichholzaunenwälder an Fließgewässern

Arten der FFH-RL

- Meerneunauge
- Flussneunauge
- Finte
- Nordseeschnäpel
- Rapfen
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer
- Schierlings-Wasserfenchel

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Zollenspieker

Lebensräume der FFH-RL:

- Ästuarien
- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume
- Erlen- und Eschenwälder und Weichholzaunenwälder an Fließgewässern
- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition
- Schlammige Flussufer mit Vegetation der Verbände *Chenopodion rubri* und *Bidention*

Arten der FFH-RL

- Meerneunauge
- Flussneunauge
- Bitterling
- Finte
- Nordseeschnäpel
- Rapfen
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer
- Schierlings-Wasserfenchel

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Kiebitzbrack

Lebensräume der FFH-RL:

- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition
- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume

Arten der FFH-RL

- Bitterling
- Rapfen
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Kirchwerder Wiesen

Lebensräume der FFH-RL:

- Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis montanen Höhenstufe inkl. Waldsäume

Arten der FFH-RL

- Bitterling
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer
- Kamm-Molch

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Borghorster Elblandschaft

Lebensräume der FFH-RL:

- Ästuarien
- Sandheiden mit *Calluna* und *Genista* (Dünen im Binnenland, alt und kalkarm)
- Offene Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* auf Binnendünen
- Brenndolden-Auenwiesen der Stromtäler
- Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe
- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition

Arten der FFH-RL

- Meerneunauge
- Flussneunauge
- Finte
- Rapfen
- Steinbeißer

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Schnaakenmoor

Lebensräume der FFH-RL:

- Sandheiden mit *Calluna* und *Genista* (Dünen im Binnenland, alt und kalkarm)
- Offene Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* auf Binnendünen
- Geschädigte Hochmoore
- Birken-Moorwald

Arten der FFH-RL

- Kamm-Molch

Lebensräume und Arten nach EG-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie

NSG Boberger Niederung (teilweise)

Lebensräume der FFH-RL:

- Sandheiden mit *Calluna* und *Genista* (Dünen im Binnenland, alt und kalkarm)
- Offene Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* auf Binnendünen
- Subkontinentale Blauschillergrasrasen
- Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe
- Alte bodensaure Eichenwälder mit *Quercus robur* auf Sandebenen